

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 16-4 70 047768

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS

C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL

25 Francs

Supplément N° 2 au Bulletin N° 115

13 AVRIL 1970

- 7 -

AVERTISSEMENTS -

TAVELURE DU POIRIER

ARBRES FRUITIERS

Malgré les conditions climatiques peu favorables, la végétation des poiriers, s'est développée depuis notre dernier Bulletin du 2 Avril.

Dans les secteurs les plus chauds, les variétés les plus précoces sont arrivées ou ont parfois dépassé le stade D 3. Dans les régions plus froides, les variétés les plus précoces arrivent au stade D 3 à partir duquel elles sont particulièrement sensibles aux contaminations.

Des projections d'ascospores sont observées même dans les régions les plus froides du Nord de l'Eure-et-Loir. Elles sont encore peu importantes mais elles augmentent régulièrement malgré les températures anormalement basses. Si une hausse sensible des températures survient, la maturation des périthèces sera accélérée et les projections deviendront alors rapidement importantes.

Les pluies ont été, en général, suffisantes pour lessiver le traitement qui devait être exécuté aux stades C 3 - D.

En conséquence, il y a lieu d'effectuer, s'il n'a pas été fait, le traitement conseillé dans notre Bulletin du 2 Avril qui devait être appliqué au plus tard lorsque la majorité des boutons atteindrait le stade D 3. Il y aura lieu de le renouveler dans tous les cas où il aura été lessivé.

TAVELURE DU POMMIER

Pour les mêmes raisons que pour la Tavelure du Poirier, il est conseillé d'effectuer un traitement sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C 3.

Pour les variétés un peu plus tardives qui viennent de recevoir la première application le traitement pourra être retardé de quelques jours. Toutefois, il ne faut pas oublier que le développement de la végétation diminue rapidement son efficacité.

Pour les variétés plus tardives il y a lieu d'effectuer une première application dès que la majorité des bourgeons arrivera au stade C 3 sans attendre un nouvel avis de la Station.

Il y a lieu de continuer la protection dans tous les vergers où les manifestations de la maladie ont été nombreuses l'année dernière.

MONILIA DU CERISIER ET DU PRUNIER

Les conditions climatiques actuelles sont favorables à cette maladie. Il y a donc lieu de tenir compte des indications données dans notre Bulletin du 2 Avril.

CULTURES OLEAGINEUSES

CHARANCON DE LA TIGE DU COLZA

L'activité des Charançons de la tige est toujours réduite du fait des températures actuelles.

Dans de nombreuses cultures, les Colzas ont dépassé le stade où les attaques de ce ravageur peuvent être dangereuses. Toutefois, certains Colzas plus tardifs n'ont pas encore dépassé ce stade sensible.

Des sorties de Charançons de la tige peuvent encore avoir lieu.

En conséquence, il est conseillé de surveiller les cultures tardives afin d'intervenir, le cas échéant, en tenant compte des indications données dans notre Bulletin du 24 Mars.

MELIGETHE DU COLZA

Les premiers adultes ont déjà été observés depuis quelques jours. Cependant, les températures anormalement basses ont empêché toute activité importante de ce ravageur. Toutefois, il est à craindre une infestation rapide des cultures si un relèvement sensible des températures survient. Il est donc prudent de surveiller les cultures dès à présent.

Il ne faut jamais oublier que les dégâts sont d'autant plus importants que les plantes sont peu développées et que les boutons floraux sont encore petits, serrés et à demi-cachés par les feuilles du sommet.

Une intervention sera nécessaire dès qu'on observera la présence de plusieurs insectes par pied. On utilisera l'un des produits conseillés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

CULTURES LEGUMIERES

SITONE DU POIS

Les conditions climatiques étant peu favorables à la végétation des petits pois, il y a lieu de surveiller attentivement les cultures en cours de levée pour intervenir, le cas échéant, en tenant compte des indications données dans notre Bulletin du 2 Avril.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles,

G. RIBAUT
B. PACQUETEAU

L'Inspecteur de la Protection des
Végétaux,

G. BENAS